



CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

14° Bollettino Agronomico del 12/06/2020

Il Protocollo Viticolo edizione 2020 è disponibile sul sito del Consorzio di Tutela, www.prosecco.it, e verrà poi recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole del Conegliano Valdobbiadene. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

I dati registrati dalle capannine meteo distribuite all'interno della Denominazione sono consultabili al seguente link: <https://sunflower.nesasrl.eu>.

Di seguito le credenziali per accedere al sito:

username: docg

password: d4cg

METEO

L'attuale circolazione anticiclonica cesserà già tra sabato e domenica, quando il Veneto entrerà nel raggio d'azione di una depressione con nucleo sull'Oceano Atlantico in prossimità di Europa Occidentale e Gran Bretagna; fino a sabato condizioni meteorologiche tipicamente estive, poi in prevalenza parzialmente nuvoloso o nuvoloso con piogge specie tra domenica e lunedì. (fonte: www.arpa.veneto.it)

PRECIPITAZIONI

Data	Valdobbiadene	Santo Stefano	Col San Martino	Miane	Cison di Valmarino	S. Pietro di Feletto	Conegliano	Vittorio Veneto	Soligetto	Formeniga	Colle Umberto	Tarzo	Vidor	Susegana	Colfosco	Farra di Soligo
01/06/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02/06/2020	0,6	0,8	0,8	1	9,6	0	0,4	1,4	3	1	1,4	1,4	0	0	0,2	1
03/06/2020	1,4	5,6	6,6	1,6	5,2	1	0,2	0	0	0	0	0,2	4,4	1,2	0,8	5,6
04/06/2020	64,2	59,2	64,6	79,4	75,6	35,2	40,2	40,2	71,6	55,8	50,4	80,2	57	60,2	58,2	73,4
05/06/2020	21	19,4	14,6	36	45,6	36,4	21,8	25,8	13	22,8	24,8	26,4	8,8	5,6	7,2	20,2
06/06/2020	0,6	2	5,2	16	37,8	5,4	5,8	2,8	14,2	4,2	5,4	12	7	22	22,8	13,8
07/06/2020	33	51,6	44	43,8	114,4	41	34,4	53,8	59,8	50,6	36,8	54,8		47	54,2	49,2
08/06/2020	60,4	43,2	41,2	32,8	57,4	29,4	21,8	19,2	51,2	26,2	19,6	60,6	62,6	35,4	63,2	41,6
09/06/2020	24,8	38,8	31,4	89,4	69,4	23,6	11,6	28	40,8	30,4	10,8	53,2	0		19,4	36,6
10/06/2020	4,8	14	11,6	11,8	19,4	8,2	15,2	38,8	5,4	22	71,8	29,8	13,08	0	0,6	13,6
11/06/2020	1,6	4,4	3,4	0,6	0,4	7,6	1,8	0,6	1,2	15,8	0	0,2	9,46	0,6	24,6	2
Totale	212,4	239	223,4	312,4	434,8	187,8	153,2	210,6	260,2	228,8	221	318,8	162,34	172	251,2	257

Tabella 1. Precipitazioni registrate nella Denominazione nell'ultimo periodo, dal 01/06 al 11/06, espresse in mm di acqua caduti.

FENOLOGIA

Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dello sviluppo fenologico del grappolo registrati nell'ultima settimana nei vigneti testimone all'interno della Denominazione.

LOCALITA'	BBCH 11/06 grappolo	fase fenologica grappolo
Colle Umberto	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Carpesica	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Conegliano	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
S. Maria di F.	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Refrontolo	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe

Collalto	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Colfosco	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Rolle	72	Bacche più piccole di un grano di pepe
Premaor	72	Bacche più piccole di un grano di pepe
Combai	70	Tutte le caliptre sono cadute
Soligo	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Col S. Martino	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Cartizze	72	Bacche più piccole di un grano di pepe
Colbertaldo	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Valdobbiadene	73	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe

Tabella 2. Sviluppo fenologico nei 15 vigneti testimone della Denominazione, con scala BBCH grappolo al 11/06/2020.

Dalla Tabella 2 si evince come in tutte le stazioni di monitoraggio della fenologia distribuite omogeneamente all'interno della Denominazione Conegliano Valdobbiadene sia cominciata la fase di allegazione, con le bacche che si presentano, nella maggior parte dei casi, delle dimensioni di un grano di pepe (le località di Rolle, Premaor e Cartizze rivelano bacche più piccole di un grano di pepe). L'unica stazione che si presenta ancora leggermente in ritardo è Combai, dove si sta ultimando la fase di fioritura.

FLAVESCENZA DORATA

Lo *Scaphoideus titanus* è il vettore della Flavescenza dorata della vite, malattia infettiva epidemica che ha nuovamente assunto grande diffusione e gravità negli ultimi anni nella nostra Denominazione. L'insetto compie una sola generazione all'anno; i primi giovani della specie compaiono in primavera, generalmente a partire dalla seconda metà di maggio; la schiusa delle uova è scalare e prosegue anche nel mese di giugno.

In queste settimane si stanno eseguendo i monitoraggi dell'insetto al fine di definire il momento migliore per il posizionamento dell'intervento insetticida.

Nella giornata di lunedì 15 o martedì 16 giugno verranno divulgati i dati riscontrati con l'ultimo monitoraggio che verrà eseguito all'inizio della prossima settimana.

STRATEGIE DI DIFESA

I modelli previsionali (DSS) rilevano un abbassamento del grado di copertura dato dall'ultimo trattamento consigliato, viste le consistenti piogge verificatesi negli scorsi giorni.

Conseguentemente, si consiglia di posizionare il trattamento fitosanitario **tra oggi o al più tardi nella giornata di domenica 14 giugno.**

Di seguito la strategia di difesa:

PERONOSPORA:

Zoxamide (alla dose di etichetta ad ettaro)

Oppure

Rame sottoforma di **poltiglia bordolese** o **ossicloruro** (alla dose di 400 gr/ha di rame metallo).

Si consiglia di abbinare ai prodotti sopra menzionati quanto di seguito riportato:

Mandipropamide (alla dose di etichetta ad ha; utilizzabile per un massimo di 4 volte, sia da sola che in alternativa ad altri CAA) o **Dimetomorph** (alla dose di etichetta ad ha; utilizzabile per un massimo di 3 volte)

oppure

Ametoctradin (alla dose di etichetta ad ettaro)

oppure

Oxathiapiprolin (alla dose di etichetta ad ettaro).

OIDIO:

Zolfo bagnabile (alla dose di 4 kg/ha).

Si consiglia di abbinare ai prodotti sopra menzionati quanto di seguito riportato:

IBE (quelli utilizzabili in DOCG sono i seguenti: tetraconazolo, fenbuconazolo, flutriafol, difenoconazolo) (alla dose di etichetta ad ha).

ATTENZIONE:

IBE (Inibitori Biosintesi Ergosterolo): difenoconazolo limitato ad un solo intervento all'anno.

oppure

Cyflufenamid (alla dose di etichetta ad ha).

PRIMA DELL'UTILIZZO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. SI RIBADISCE AI VITICOLTORI L'IMPORTANZA DI ALTERNARE LE SOSTANZE ATTIVE, IN MODO DA RISPETTARE CORRETTAMENTE GLI INTERVALLI DI TEMPO PREVISTI TRA I TRATTAMENTI ESEGUITI.